

Catalogue des analyses - Autres

Coloscopie

Informations générales

Spécialité

- Gastro-entérologie

Indication - But de la prestation

Iléus paralytique
Susp. de perforation digestive
Susp. de sténose
Susp. d'obstacle mécanique
Diverticulite aiguë
Troubles importants de l'état de conscience
(danger de bronchoaspiration)

Conditions

Si Sintrom, Marcoumar, etc. ou liquémine
Doit être relayé sous prescription médicale ou maintenu avec accord gastro-entérologue

Examens

Contact

65 366
63 569

Prise de rdv

40 715

Inscrire

Indications
Crise sanguine <10 jours (TP-PTT-Plaquettes)

Préparation du patient

J-2

Régime limité en résidus:
ni fruit, ni jus de fruit, jus sans pulpe (ex. pomme) autorisés
pas de légume sauf pomme de terre
pas de pain complet ou céréales complètes
pas de lait
dans logimem, choisir dans supplémentaires: profile
colono2, s'il reste au moins 2 jours complet avant coloscopie
colono1, s'il reste au moins 1 jours complet avant coloscopie et ajouter régime limité en résidus pour le soir ou
l'examen est demandé

J-1

Poursuivre régime limité en résidus

Durant l'après-midi à partir de 16h régime liquide clair (automatique si colono choisi dans logimen), bouillon clair, jus sans pulpe, thé, tisane, thé froid, limonade, pas de sirop ou de boisson de couleur rouge

J

Au réveil de 6H, poursuivre la préparation colique en donnant 2 litres de klean-prep, selon protocole de la gastroentérologie.

La préparation doit être terminée et le patient à jeun au minimum 3 heures avant l'heure prévue de l'examen, pour les anesthésies générales 4 h avant

Acheminement

Patient

En lit

Document

Avec dossier

Surveillance

Selon O.M

Selon ordres sur dossier cible

Fournisseur

Identification

Centre d'endoscopies - gastro-entérologie

BH-07 PP-738

Adultes tél.: 40 653

Enfants tél.: 43 066

Horaires

L---> V 07H00-17H00

Durée de la prestation

2 heures au minimum

Administration de produit

Produit de contraste (évent.)

Activité

Prestations suppl.

Polypectomie

Biopsie

Dilatation