



Catalogue des analyses - Autres

Biopsie rénale percutanée

Informations générales

Spécialité

- Néphrologie

Conditions

Hb, Ht, leucocytes, thrombocytes, TP, PTT doivent être dans les normes pour que la biopsie puisse être faite

Examens

Prise de rdv

41 130 / 41 131

Acheminement

Patient

Radiologie BH-07

Document

Dossier clinique + radiologique (urographie)

Surveillance

Selon O.M

Patient doit rester alité pendant 24 heures

Il peut manger et boire 1 heure après la biopsie. Boire au minimum 1500–2000 ml en 24 heures

Signes vitaux surveillance rigoureuse:

Toutes les demi-heures pendant 2 heures

Puis toutes les 2 heures pendant la journée

Puis 2-3 fois pendant la nuit

Surveillance locale d'un risque d'hémorragie

Faire un hémostix dans les urines après chaque miction durant les premières 24 heures

Signaler au médecin toute modification des signes vitaux et/ou la présence d'une hématurie macroscopique

Le lendemain de la biopsie faire :

FSS

Uries complètes



Fournisseur

Identification

Division de néphrologie - consultations

Ouest du Bugnon NIV 02

Tél.: 41 130 - 41 131

Activité

Biopsie rénale