Catalogue des analyses - Autres

Biopsie rénale percutanée

Informations générales

Spécialité

- Néphrologie

Conditions

Hb, Ht, leucocytes, thrombocytes, TP, PTT doivent être dans les normes pour que la biopsie puisse être faite

Examens

Prise de rdv

41 130 / 41 131

Acheminement

Patient

Radiologie BH-07

Document

Dossier clinique + radiologique (urographie)

Surveillance

Selon O.M

Patient doit rester alité pendant 24 heures
Il peut manger et boire 1 heure après la biopsie. Boire au minimum 1500-2000 ml en 24 heures
Signes vitaux surveillance rigoureuse:
Toutes les demi-heures pendant 2 heures
Puis toutes les 2 heures pendant la journée
Puis 2-3 fois pendant la nuit
Surveillance locale d'un risque d'hémorragie
Faire un hémastix dans les urines après chaque miction durant les premières 24 heures
Signaler au médecin toute modification des signes vitaux et/ou la présence d'une hématurie macroscopique
Le lendemain de la biopsie faire :
FSS
Urines complètes

Fournisseur

Identification

Division de néphrologie - consultations
Ouest du Bugnon NIV 02
Tél.: 41 130 - 41 131

Activité

Biopsie rénale