



Catalogue des analyses - Laboratoire

Inhibine B

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient

Chez les femmes préménopausées, la détermination devrait être effectuée de manière standardisée entre J3 et J5 de leur cycle.
Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que le patient a été informé et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/mois

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature


- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Volume minimum

1ml sérum

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

si AMH demandée également, un seul tube suffit

Matériel pédiatrique**Quantité**

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

si AMH demandée également, 2 microtubes suffisent

Traitements du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

centrifuger, décanter et congeler (volume minimum de sérum: 250ul)

Conservation

-20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer congelé sur glace carbonique

Acheminement



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Immunoenzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

68

Condition(s) spéciale(s)

Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS)