



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Activité anti-facteur Xa

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage de l'activité anti Xa pour le suivi des patients sous Héparine standard, Héparine de bas poids moléculaire (Clexane®, Fraxiparine®, Fragmine®, Danaparoïde (Orgaran®), Fondaparinux (Arixtra®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) ou Edoxaban (Lixiana®)).

Attention : en présence de 2 molécules anti-Xa, le test de laboratoire ne permet pas de les différencier, elles sont cumulées dans le résultat rendu.

Prestations simultanées = PTT et TT selon l'anticoagulant.

#### Préparation du patient

Important pour HBPM (Fraxiparine, Clexane et Arixtra):  
La prise de sang de contrôle doit être faite entre 3 et 5 heures après l'injection  
Si injection sous cutanée (Orgaran ou héparine standard) prise de sang à mi-temps entre 2 injections

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 200

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

Activité anti Xa, activité anti facteur X activé

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

023 - Hématologie hémostatse

#### Renseignements à fournir

Cocher activité anti-Xa selon l'anticoagulant à contrôler. Dans "renseignements médicaux", préciser l'heure et la dose de l'injection

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**


- Sang veineux

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3 ml citrate de sodium




Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

**Matériel pédiatrique****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

**Stabilité maximale avant envoi****Ambiant**

4h

**Réfrigéré**

6h si plasma séparé

**Traitements du prélèvement pour requérants externes****Préparation**

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

**Conservation**

aliquots à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

**Acheminement****Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<u>Hématologie générale 24/7</u>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 2h
<b>Interprétation</b>	Paramètres testés: Activité anti-Xa HEP std U/ml, HBPM U/ml, Orgaran U/ml, Arixtra ug/ml, Xarelto ng/ml, Eliquis ng/ml, Lixiana ng/ml

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	• Colorimétrique
-------------------------------	------------------



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 24 heures

### Tarif

**Tarif (CHF)** 40.5