Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00300

V16 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Catécholamines

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Ne pas envoyer par poste pneumatique
- Condition particulière de préparation

Informations générales

Examer	٠

Indication diagnostique	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome
Préparation du patient	24h avant le prélèvement, ne pas absorber de café, thé, chocolat, banane, alcool et cigarette. Etre à jeûn. Allonger le patient, poser un Venflon (pour éviter le stress de la piqûre) et prélever le sang 15 minutes plus tard.
Renseignement téléphonique	021 31 40 741
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécu	1x/par semaine, le jeudi matin, rendu des résultats le vendredi
Synonyme	Catecholamines, adrénaline, épinéphrine, noradrénaline, norépinéphrine, dopamine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 019 - Laboratoire catécholamines et peptides
Renseignements à fournir	Médicaments administrés



Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Mettre le tube dans la glace et l'amener au laboratoire dans les 30 minutes suivant le prélèvement.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 7.5 ml suffit pour les métanéphrines libres, les métanép totales et les catécholamines plasmatiques

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Volume minimum

Idéalement, prélever avec un tube de 2.6 ml (ou plus), ou au minimum a tube de 1.2 ml héparinate de lithium.

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 2.6 ml suffit pour les métanéphrines libres, les métanéphrines les catécholamines plasmatiques

Matériel néonatologie

Quantité

3

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Suffit pour les métanéphrines libres, les métanéphrines totales et les catécholamines plasmatiques

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Prélever le sang et placer le tube immédiatement dans la glace. Centrifuger à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. Préparer 2 aliquots de plasma et congeler rapidement (idéalement à -80°C).
Conditions d'acheminement	Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou un bloc de congélation directement au laboratoire des Catécholamines et Peptides, Laboratoire 6019, Avenue Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Par transporteur (THEO) dans de la glace au laboratoire des Catécholamines à l'Hôpital Nestlé, 6ème étage, n°6019, dans les 30 minutes maximum après le prélèvement.
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire des catécholamines et peptides
Site	NES 06-6019
Adresse	Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 741



Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire des catécholamines et peptides

NES 06-6019

Adresse

Avenue Pierre Decker
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

Résultats

Délai de rendu

Interprétation Paramètres: Adrénaline, Noradrénaline et Dopamine

Méthode analytique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Supplément selon la liste des analyses facturables en sus

