



Catalogue des analyses - Laboratoire

Nilotinib

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sanguin de nilotinib.
Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Exécution mardis (si tube reçu au laboratoire avant midi), rendu de résultats les mercredis. Sous réserve de modification.

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Tasigna®

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)
Délai d'équilibration: dès 1 semaine à posologie constante


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s) Sérum sans gel 4.9 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimum Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Matériel néonatalogie

Contenant(s) autre(s) <p>Serum sans gel 2.6ml</p>

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 72h

Réfrigéré 72h

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:
Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter
sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T° ambiante ou réfrigéré: sang complet ou plasma 72h jusqu'à
réception au laboratoire.
A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.

Conditions d'acheminement Acheminement si possible congelé
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés.

Acheminement

Conditions d'acheminement Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours
fériés jusqu'à 15h00.



Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma
PP439 Urgence: par porteur + nous contacter

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de pharmacologie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu

1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- HPLC-MS/MS



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 126

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min