



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dolutegravir

Sang



## Information(s) importante(s)

### Attention

- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de dolutegravir (intervalle de référence disponible)

#### Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

#### Synonyme

Tivicay®, dans Triumeq®

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

##### Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si <30j)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)  
Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante


#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

##### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

#### Matériel pédiatrique

##### Quantité

1

##### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

##### Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

##### Volume minimum

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

#### Stabilité maximale avant envoi

##### Ambiant

24h

##### Réfrigéré

48h

#### Traitements du prélèvement pour requérants externes

##### Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et **décanter sans délai** le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

##### Conservation

Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C



---

**Conditions d'acheminement**

Congelé  
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés  
Recommandations d'envoi matériel HIV

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.  
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma  
PP:439

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de pharmacologie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
BH18-218  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 44 271

### Résultats

**Interprétation** <48h dès résultat

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • HPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 6 jours

**Aliquote congelé** 2 semaines

### Tarif

**Tarif (CHF)** 144

**Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min