Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-récepteur TSH (TRAK)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	TRAB

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum 

	Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002
Volume minimum	2 microtubes biens remplis
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml
Conservation	A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1 semaine

Méthode analytique

Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	28.8