Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcitonine (CT)

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Effectuer le prélèvement de préférence à jeun (ou au moins à distance des repas pour éviter l'hypergastrinémie). En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, effectuer le prélèvement avant la prise de médicament, mais idéalement, si l'arrêt du traitement est possible, effectuer le prélèvement après 2 semaines d'arrêt.
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Thyrocalcitonine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Si le transport au laboratoire n'est pas possible **dans un délai de 30 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum. Eviter l'hémolyse.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum	2 microtubes bien remplis
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Eviter l'hémolyse. **Immédiatement** centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml
Conservation	**Immédiatement** congeler le sérum à -20°C
Conditions d'acheminement	**A -20°C**

Acheminement

Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement. Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an

Tarif

Tarif (CHF)	54