



Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcitonine (CT)

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Effectuer le prélèvement de préférence à jeun (ou au moins à distance des repas pour éviter l'hypergastrinémie).
En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, effectuer le prélèvement avant la prise de médicament, mais idéalement, si l'arrêt du traitement est possible, effectuer le prélèvement après 2 semaines d'arrêt.

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Thyrocalcitonine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si le transport au laboratoire n'est pas possible **dans un délai de 30 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum. Eviter l'hémolyse.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Eviter l'hémolyse.

Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Immédiatement congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement

A -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement.

Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100



Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 411 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 54