Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatine / guanidinoacétate

LCR

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme - Déficiences en créatine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Créatine, GAA, guanidinoacetic acid

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232 **Lien** 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	0.250 ml

Stabilité maximale avant analyse

Congelé	Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes, 3600 g. Décanter le LCR ; volume minimum : 0.250 ml
Conservation	Conserver dans un congélateur à -80°C
Conditions d'acheminement	Envoyer sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	130.5