Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthotrexate

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de méthotrexate (taux visé dépendant du protocole oncologique). **Attention** : un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.
Indication diagnostique	Lors d'administration de méthotrexate à haute dose pour guider le sauvetage par l'acide folinique (Leucovorin).
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Prévenir le laboratoire (021 31 **44 166** ou 021 31 **44 280**) du protocole avec le "timing" prévu pour les différents prélèvements et indiquer le délai maximal pour le rendu des résultats.
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Selon le protocole oncologique appliqué : Adultes : Taux de 24h et 36h sont analysés en même temps que le taux de 48h. Taux ≥ 48h : analysé de suite Pédiatrie : Taux ≥ 24h : analysé de suite
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Améthoptérine, Methotrexat, Metoject

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999070 **Lien** 013 - Chimie clinique - Médicaments **Lien** TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Attention : un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Moment de la prise de sang : selon le protocole oncologique appliqué

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 300 µl
Un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.

Conservation

à l'abri de la lumière (papier aluminium) et à 4°C (si > 48 h, congeler à -20°C)

Conditions d'acheminement

à 4°C si l'acheminement se fait dans les 48 h, sinon à -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement	Envoi immédiat à l'abri de la lumière (papier aluminium)
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 **42 500**), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas d'urgence**.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	75.6
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min