Catalogue des analyses - Laboratoire

Paracétamol

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique de taux sanguin de paracétamol (nomogramme de Rumack). **Attention** : un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.
Indication diagnostique	- Lors de suspicion d'intoxication pour déterminer si l'administration de N-acétylcystéine est indiquée. - Lors de test d'absorption.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	• Suspicion de toxicité: 24/7. • Tests d'absorption: 8h-16h pendant les jours ouvrables.
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Acétalgine, acetaminophen, acétaminophène, APAP, Dafalgan, Dolprone, Panadol, Tylenol, Zolben

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999070 **Lien** 013 - Chimie clinique - Médicaments **Lien** TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations
Renseignements à fournir	Documenter au minimum l'heure réelle de la prise de sang ainsi que l'heure (présumée) de l'intoxication, qui doivent être séparées d'au moins 4 heures pour qu'une interprétation du risque de toxicité soit possible.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement :- intoxication / tentamen : au minimum 4 heures après la prise- test d'absorption : typiquement 5 min, 10 min, 15 min, 60 min et 120 min après la prise

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 200 µl

Conservation

à 4°C

Conditions d'acheminement

immédiatement et à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 **42 500**), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas d'urgence**.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• EMIT
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	12.9
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min