Catalogue des analyses - Laboratoire

Tacrolimus

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tacrolimus (intervalle de référence greffe dépendant). **Attention** : un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x par jour Jours ouvrables: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 12h Samedi/Dimanche/Jours fériés: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 10h30 Pour demandeurs externes : jours ouvrables uniquement Si demande en urgence, contacter le laboratoire.
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Advagraf, FK 506, Prograf

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999070 **Lien** 013 - Chimie clinique - Médicaments **Lien** TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Attention : un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul

possible avec un autre médicament sur la même demande.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	**- Délai d'équilibration :** 2-3 jours à posologie constante **- Délai de prélèvement :** juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K  Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Volume minimum	0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Un bon par médicament et par prélèvement. Pas de cumul possible avec un autre médicament sur la même demande.
Conservation	Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.5 ml)
Conditions d'acheminement	A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46

	1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Obtention des résultats : - jours ouvrables : le jour même pour les prélèvements reçus avant 12h00 - samedi/dimanche/jours fériés (demandeurs internes) : le jour même pour les prélèvements reçus avant 10h30Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott
Technique	Mesure après extraction du sang complet

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	48 h

Tarif

Tarif (CHF)	49.5
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min