



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine D (25-OH)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Limitation selon la LA dès le 1.7.2022

1. Facturable une seule fois en cas de détermination séparée des deux formes de 25-hydroxy-vitamine D (25-OH-D3 et 25-OH-D2)
2. Uniquement chez les patients:
 - souffrant ou suspectés de souffrir d'une des pathologies suivantes:
 - ostéomalacie, rachitisme
 - ostéopénie
 - ostéoporose
 - fracture non traumatique
 - après une chute de cause peu claire chez les patients ≥ 65 ans
 - risque anamnestique accru de fracture chez les patients ≥ 65 ans
 - avec des pathologies suivantes affectant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption:
 - maladies rénales, y inclus l'urolithiasie,
 - troubles de l'hormone parathyroïdienne, de la calcémie et/ou de la phosphatémie
 - maladies gastro-intestinales
 - syndromes de malabsorption
 - maladies hépatiques
 - prenant des médicaments influençant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption.
3. En cas de suivi du taux de vitamine D dans le cadre d'un des cas listés sous le point 2, l'analyse peut être facturée au maximum une fois tous les 3 mois.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Vitamine D2 (25-OH), vitamine D3 (25-OH), 25-hydroxy vitamine D2, 25-hydroxy-vitamine D3, 25-OH-vitamine D2, 25-OH-vitamine D3, calcidiol, calcifediol

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum  Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter sérum (vol idéal y.c sérothèque > 1 ml)

Conservation Conserver le sérum à 4°C
si > 48 h conserver à -20°C

Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à température ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur LIAISON XL / DiaSorin

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 47.7

Condition(s) spéciale(s) Voir limitation d'indication clinique pour le remboursement par la LAMal.
Merci d'en informer le patient en cas de non remboursement.