Catalogue des analyses - Laboratoire

Coxiella burnetii

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Suspicion d'endocardite
Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 6 jours post prélèvement. Hors de ce délai veuillez contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Sérologie microbienne
Synonyme	Fièvre Q

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 913346 **Lien** 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum gel



Monovette ISO bouchon MARRON - N° commande : 966438

Contenant(s) autre(s)	Tube 4.9 ml sérum sans gel

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	24h
Réfrigéré	Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Acheminement dans les 12h (jours ouvrables) post prélèvement : T° ambiante Acheminement au-delà de 12h (jours ouvrables) post prélèvement : congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Chemiluminescence • IF
Analyseur	VirClia LOTUS
Technique	Dépistage IgG et IgM phase 2 par chemiluminescence, titration des positifs par immunofluorescence IgG et IgM phase 1 et phase 2

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Echantillon aliquoté : 6 jours post-réception au laboratoire
Aliquote congelé	3 ans

Tarif

Tarif (CHF)	160.2
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus