



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cabotegravir

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de cabotegravir.

**Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71

Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Exécution mardis (si tube reçu au laboratoire avant lundis 17h00), rendu de résultats les mercredis. Sous réserve de modification.

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

##### Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)  
Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 4.9 ml sérum sans gel

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

**Contenant(s) autre(s)**

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

**Volume minimum**

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

48h

**Réfrigéré**

48h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:  
Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

**Conservation**

A T° ambiante: sang complet 72h et plasma 48h jusqu'à réception au laboratoire.  
Réfrigéré: sang complet 72h et plasma 48h jusqu'à réception au laboratoire.  
A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.

**Conditions d'acheminement**

Acheminement si possible congelé  
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés  
Recommandations d'envoi matériel HIV

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.  
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma

PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de pharmacologie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
BH18-218  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 44 271

**Résultats****Délai de rendu**

1 semaine

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- HPLC-MS/MS



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 6 jours

---

**Aliquote congelé** 1 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 144

---

**Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min