Catalogue des analyses – Laboratoire

Dépistage MRSA

Frottis pour recherche de MRSA

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cet examen comprend une recherche spécifique de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticiline (MRSA)
Indication diagnostique	Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur le bon d'analyse. Elle peut être effectuée en urgence pour des motifs appropriés selon les mêmes directives.
Renseignement téléphonique	021 31 40 260
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hygiène prévention et contrôle de l'infection

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260 **Info** Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260 **Lien** 074 - Laboratoire d'épidémiologie
Renseignements à fournir	Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.
Recommandations	Un bon par prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Frottis
Instruction(s) particulière(s)	Frottis de nez, gorge et plis inguinaux. Utiliser l'écouvillon avec la marque rouge en dernier pour le nez. 1. Frottis des plis de l'aine • Frotter les deux plis de l'aine en tournant l'écouvillon. Attention à ne pas inclure des selles (peut causer des interférences avec le test) • Ouvrir le bouchon du tube et insérer l'écouvillon jusqu'au fond • Tremper et remuer doucement l'écouvillon dans le milieu pendant 5 secondes • Soulever l'écouvillon au dessus du liquide et le faire doucement rouler contre la paroi du tube pour récupérer le liquide en excès de la pointe de l'écouvillon • Jeter l'écouvillon dans une poubelle 2. Frottis de gorge • Presser et tourner l'écouvillon contre les amygdales et le fond de la gorge • Procéder de la même manière que pour le frottis des plis de l'aine 3. Frottis de nez • Ecouvillonner les deux narines en tournant 3-4 fois l'écouvillon sur une profondeur maximum de 1-2 cm • Mettre l'écouvillon dans le tube et le casser au point de marquage, laisser l'écouvillon dans le tube • Bien fermer le tube avec le capuchon

Matériel standard

Quantité	1
Contenant(s) autre(s)	Kit MRSA Puritan, 3 écouvillons

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant	Nuit et we

Acheminement

Conditions d'acheminement	Envoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'épidémiologie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences
Téléphone	021 31 40 260
Site web	Epidémiologie

Résultats

Interprétation	Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Culture sur des milieux séléctifs