Catalogue des analyses - Laboratoire

Anti-Endomysium IgA

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Suspicion d'entéropathie sensible au gluten (maladie cœliaque, sprue, dermatite herpétiforme de Dühring)
Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence d'exécution	1x/jour
Spécialité	• Externalisé

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** USZ - Immunologische Untersuchungen Autoantikörper
Recommandations	En cas de suspicion de maladie cœliaque, la détermination des IgG/IgA anti-gliadine et des IgA totales est également recommandée. Dans le cas d'un déficit en IgA, qui survient plus fréquemment chez les patients atteints de la maladie cœliaque, l'AK de type IgG contre la transglutaminase peut être déterminée.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Tube d'héparine, d'EDTA ou de citrate.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Contenant(s) autre(s)

Tube d'héparine, d'EDTA ou de citrate.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

3 semaines

Congelé

1 an

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation