



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ethambutol

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de l'éthambutol

**Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71

Interprétation des taux (TDM): 079 556 18 03 ou, en cas de non réponse, au 021 314 25 00

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Envois à notre sous-traitant les mardis si tubes arrivés avant 10h00 dans notre laboratoire. Sous réserve de modification.

#### Analyse accréditée

NON

#### Analyse sous-traitée

OUI

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

#### Synonyme

Rimstar, Myambutol

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

##### Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)**

Prélèvement : **2h** après la dernière prise orale.

Délai d'équilibration: Traitement stable depuis  $\geq 1$  semaine

Le même tube peut servir au dosage de plusieurs antituberculeux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 4.9 ml sérum sans gel

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo si possibilité de tout dos

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.3 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

**Contenant(s) autre(s)**

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

**Volume minimum**

Microtube bien rempli.

Si cumul d'examen: voir avec labo PCL8 (44 271) si besoin d'augmenter le nombre de microvettes

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

48h

**Réfrigéré**

48h

**Congelé**

Oui

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:  
Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter  
sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

### Conservation

A T° ambiante ou réfrigéré: sang complet ou plasma 48h jusqu'à  
réception au laboratoire.  
A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.

### Conditions d'acheminement

Acheminement si possible congelé  
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours  
fériés jusqu'à 15h00.  
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma  
PP:439

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacologie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 44 271
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	1-2 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LC-MS/MS</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Conservation après examens</b>	
<b>Prélèvement primaire</b>	6 jours
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	166.5
<b>Prestation Tarmed</b>	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min