



Catalogue des analyses - Laboratoire

Rénine activité

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone. J-15 arrêt de antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bétabloquant). J-5 régime normosode . Jour J.
Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis)
(Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

NON

Synonyme

PRA, Activité de la rénine

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

999069

Lien010 - Chimie clinique - Sang**Renseignements à fournir**

Médicaments en cours. Volume des urines de 24 heures - Na urines de 24h (si disponible).

Pré analytique

Prélèvement**Instruction(s) particulière(s)**


Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit être mis immédiatement dans le tube réfrigéré.

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K
	Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum	Volume de plasma peut être réduit à 400 µl
-----------------------	--

Matériel néonatalogie

Quantité	2x tubes bien remplis
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K
	Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum	Volume de plasma peut être réduit à 400 µl
-----------------------	--

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant	Non
Réfrigéré	Oui
Congelé	Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifugation, décantation, congélation.
Conservation	Plasma congelé
Conditions d'acheminement	Plasma congelé, dans les 2-3 jours suivant le prélèvement

Acheminement	
Conditions d'acheminement	Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Oui, systématiquement, selon TarMed

Méthode analytique

Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 61.2