Catalogue des analyses - Laboratoire

Aldostérone

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone, J-15 arrêt de antihyperteneurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bétabloquant), J-5 régime normosode. Jour J. Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis) (Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Médicaments en cours, volume des urines de 24 heures - Na urines de 24 h (si disponible)


Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard


Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Matériel pédiatrique

Quantité	3x tubes bien remplis
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	Non
Réfrigéré	Oui
Congelé	Non

Acheminement

Conditions d'acheminement	Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Oui, systématiquement, selon TarMed.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	27