Procédure de soin

Sonde vésicale / Retrait de la sonde

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tableau des antiseptiques au CHUV
Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV
Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Sonde vésicale

Technique de soin

Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
1 Boite de gants non stériles
1 Protection pour le lit
1 Pot à urine non stérile
1 Seringue 10ml
1 Sac à déchets urbains

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Installer le/la patient(e)
- Mettre la protection du lit sous le siège
- Mettre une paire de gants non stériles
- Vider le sac collecteur et quantifier les urines dans un bocal de recueil
- Acheminer le bocal de recueil vers le laveur-désinfecteur du vidoir
  Attention ! ne jamais jeter les urines dans les toilettes
- Retirer le système de fixation de la sonde
- Connecter la seringue à l'embout du ballonnet
- Dégonfler le ballonnet en aspirant l'eau. Vérifier que le ballonnet est complètement vidé de l'eau stérile
- Demander au patient de faire une bonne inspiration – expiration
- Retirer délicatement la sonde
- Vérifier l'intégralité de la sonde
- Jeter la seringue, la sonde et le sac collecteur dans le sac à déchets urbains
- Retirer les gants
- Réinstaller le/la patient(e)
- Si nécessaire, lui donner à portée de main un vase/urinal
- Ranger le matériel
- Evaluer l'impact psychologique du retrait de la sonde chez le/la patient(e)

Liens

Procédures de soins liées

Sonde vésicale

Date de validation	Auteurs	Experts
07.07.2023	Léon Cudré, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Lara Vallarino, Infirmière / URO