

Procédure de soin

Sonde post pylorique : Pose, Alimentation, Traitement / Administration des traitements

Pédiatrie

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Sonde post pylorique : Pose, Alimentation, Traitement

Technique de soin

Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

1 Boite de gants non stériles

Médicament(s) prescrit(s)

Seringue ENFit

1 Robinet 3 voies entéral (Type : ENFit) Si besoin

Eau minérale

Préparation du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

Attention ! L'absorption des médicaments se fait principalement au niveau du duodénum. Pour les enfants avec une sonde placée en jéjunal, vérifier sur Refmed ou contacter le pharmacien pour s'assurer que l'absorption du médicament soit optimale

- Préparer les éventuels traitements selon REFMED (voir lien dans le cadre de référence ci-dessus) ou protocole d'unité

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Administrer les traitements lentement pour éviter le risque de Dumping Syndrome
- Si traitements très osmolaires, les diluer dans du lait, de l'eau en bouteille avant de les administrer
- Après administration du ou des traitement(s), bien rincer la sonde avec l'eau en bouteille
- Démarrer l'alimentation entérale selon prescription, voir : Alimentation entérale à débit continu (PED/SCEA)
- Documenter les données dans le dossier informatisé du patient

Liens

Procédures de soins liées

Sonde post pylorique : Pose, Alimentation, Traitement

Date de validation	Auteurs	Experts
07.10.2025	Silvia Alvarado, ICLS Céline Lomme, ICLS Janique Monnier, Infirmière ICLS, Méthodes de soins, DSO, CHUV Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV Chloé Tenthorey, ICLS Néonatalogie	Sabine Vasseur Maurer, Médecin associée, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV Bastien Guggisberg, Médecin hospitalier Pédiatrie Céline Fischer Fumeaux, Médecin-cadre, service de néonatalogie, Lausanne CHUV