

Procédure de soin

Sternotomie et thoracotomie : Soins et surveillances / Retrait du pansement Dermabond™ Prineo™

Pédiatrie

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

[Précautions Standard / Hygiène des mains](#)

[Hygiène, prévention et contrôle de l'infection \(HPCI\)](#)

[REFMED](#)

[Catalogue des examens](#)

[Tableau des antiseptiques au CHUV](#)

[Tableau des désinfectants au CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients \(BIP\)](#)

Directive institutionnelle : [Gestion de la douleur](#)

Directive institutionnelle : [Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments](#)

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Sternotomie et thoracotomie : Soins et surveillances

Technique de soin

Matériel

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Solvant pour adhésif médical (Type : Niltac®)

Préparation du soin

Attention ! Le pansement Dermabond™ Prineo™ est retiré dès J 14 post-chirurgie (au plus tard à J21). Il ne faut pas le retirer avant, sauf avis du chirurgien.

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Prévenir le patient et les parents
- Mettre des gants
- Décoller délicatement le Dermabond™ Prineo™ avec le solvant pour adhésif médical
- Observer la cicatrice et noter tout signe de rougeur, écoulement, induration, déhiscence de la cicatrice
- Laisser la cicatrice à l'air
- Retirer les gants
- Documenter dans le dossier le soin et toute particularité concernant la cicatrice

Finalisation du soin

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

Liens

Procédures de soins liées

Sternotomie et thoracotomie : soins et surveillances

Date de validation	Auteurs	Experts
30.06.2026		