

Procédure de soin

# Sternotomie et thoracotomie : soins et surveillances / Retrait des nœuds aux extrémités de la suture

Pédiatrie

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

[Précautions Standard / Hygiène des mains](#)

[Hygiène, prévention et contrôle de l'infection \(HPCI\)](#)

[REFMED](#)

[Catalogue des examens](#)

[Tableau des antiseptiques au CHUV](#)

[Tableau des désinfectants au CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients \(BIP\)](#)

Directive institutionnelle : [Gestion de la douleur](#)

Directive institutionnelle : [Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments](#)

**L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.**

## Contexte

### Sternotomie et thoracotomie : soins et surveillances

## Technique de soin

### Matériel

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Chlorhexidine alcoolique 2%

Set à pansement

Pince anatomique stérile

Coupe-fil stérile

## Déroulement du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Ouvrir le set à pansement
- Déposer la pince anatomique stérile et le coupe-fil stérile
- Remplir le godet d'antiseptique, Chlorhexidine 2%
- Procéder à la désinfection cutanée du site d'insertion du nœud au moyen de pince anatomique stérile, présente dans le set, de façon large avec successivement 3 tampons différents du point d'insertion vers la peau environnante et respecter le temps de séchage (~30 secondes)
- Tenir délicatement le fil avec la pince anatomique stérile et dégager le nœud de la peau
- Couper le fil sous le nœud à l'aide du coupe-fil
- Répéter les quatre points ci-dessus pour le deuxième nœud, si nécessaire
- Laisser la plaie à l'air

## Liens

### Procédures de soins liées

#### Sternotomie et thoracotomie : soins et surveillances

Date de validation	Auteurs	Experts
30.06.2026		