

Procédure de soin

# Cathéter sous cutané / Retrait du cathéter

Adulte

## Généralités

#### **Avertissement**

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

#### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi) REFMED Catalogue des examens

<u>Catalogue des examens</u>
<u>Tableau des antiseptiques au CHUV</u>
<u>Tableau des désinfectants au CHUV</u>

 $\label{eq:def:Directive} Directive institutionnelle: \underline{Bonnes\ pratiques\ de\ documentation\ et\ de\ tenue\ du\ dossier\ patient\ du\ CHUV}$   $Directive\ institutionnelle: \underline{Identitovigilance\ et\ port\ du\ bracelet\ d'identification\ des\ patients\ (\underline{BIP})}$ 

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

 $Directive\ institutionnelle: \underline{Gestion\ des\ m\'edicaments: \underline{Pr\'eparation, double-contr\^ole\ et\ administration\ des}$ 

médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

## Contexte

## Cathéter sous cutané

## Technique de soin

#### **Matériel**

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Container pour objets piquants/tranchants
- 1 Sparadrap non tissé (Type: Micropore®) ou petit pansement





#### Déroulement du soin

### **Prérequis**

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

## Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Retirer doucement le pansement tout en maintenant les ailettes du cathéter
- Retirer le cathéter par un mouvement rapide
- Appliquer une compresse stérile sur le point de ponction
- Appliquer un sparadrap
- Retirer les gants

## Liens

#### Procédures de soins liées

#### Cathéter sous cutané

Date de validation	Auteurs	Experts
17.12.2021	Valentine Gilliard, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Sophie Pouzols, ICLS

