

Procédure de soin

Drain Redon / Changement de réceptacle

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

<u>Précautions Standard / Hygiène des mains</u> <u>Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)</u> <u>REFMED</u> <u>Catalogue des examens</u>

<u>Catalogue des examens</u>
<u>Tableau des antiseptiques au CHUV</u>
<u>Tableau des désinfectants au CHUV</u>

 $\label{eq:decomposition} \begin{tabular}{ll} Directive institutionnelle: $\underline{$Bonnes$ pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV}$ Directive institutionnelle: $\underline{$Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)}$ \\$

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

 $Directive\ institutionnelle: \underline{Gestion\ des\ m\'edicaments: \underline{Pr\'eparation, double-contr\^ole\ et\ administration\ des}$

médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Drain Redon

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Boite de masques de soins
- 1 Protection pour le lit
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 2 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Récipient de Redon® stérile
- 1 Epingle à nourrice / Imperdable pour fixer le récipient, si nécessaire





Préparation du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les <u>5 moments de l'hygiène des mains</u>

- Mettre le masque de soin
- Ouvrir le paquet de compresses et les imbiber d'antiseptique alcoolique à base de chlorhexidine 2%
- Ouvrir l'emballage du nouveau récipient et assurer qu'il est clampé

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Clamper le drain (pièce blanche intégrée) pour éviter un retour des sérosités dans la plaie
- Déconnecter le drain du réceptacle
- Désinfecter l'embout du drain à l'aide des compresses imbibées d'alcool
- Connecter le nouveau réceptacle
- Déclamper le drain et le nouveau récipient
- Contrôler le maintien du vide
- Retirer les gants puis le masque
- Sécuriser le réceptacle
- Numéroter les drains/réceptacles, si plusieurs présents

Finalisation du soin

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Mesurer la quantité de liquide obtenu et documenter le volume
- Evacuer le réceptacle dans une poubelle pour liquide biologique jaune qui se trouve dans le local sale
- · Retirer les gants

Liens

Procédures de soins liées

Drain Redon

Plaie chirurgicale avec drain - refection du pansement





Date de validation	Auteurs	Experts
04.11.2019	Marco Reis de Matos, Infirmier Johanna Zeilmaker, Infirmière spécialisée	Marine Ballif, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV

