Procédure de soin

# Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation (PED/SCEA) / Retrait de la sonde

Pédiatrie

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tableau des antiseptiques au CHUV
Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV
Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

**L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.**

## Contexte

**Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation (PED/SCEA)**

## Technique de soin

### Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
1 Boite de gants non stériles
1 Protection pour le lit
1 Boite de mouchoirs
1 Solvant pour adhésif médical (Type : Niltac®)
1 Verre d'eau minérale ou autre boisson

### Déroulement du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Installer la protection sur le thorax de l'enfant
- Décoller délicatement les adhésifs sur la joue, la moustache, le nez ou le coin de la bouche. Utiliser le solvant pour adhésifs médical.
- Mettre une paire de gants non stériles
- Maintenir la sonde et tirer la sonde d'un geste rapide hors de la bouche/nez de l'enfant
- Eliminer la sonde
- Retirer les gants
- Proposer au patient de prendre quelques gorgées d'eau ou autre boisson si pas de contre-indications

# Liens

### Procédures de soins liées

**Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation (PED/SCEA)**

| Date de validation | Auteurs | Experts |
|---|---|---|
| 21.10.2024 | Céline Lomme, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV | Sabine Vasseur Maurer, Médecin associée, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV<br>Ermindo Di Paolo, Pharmacien clinicien, CHUV Lausanne |