

Procédure de soin

Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation (PED/SCEA) / Administration de la médication

Pédiatrie

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

[Précautions Standard / Hygiène des mains](#)
[Hygiène, prévention et contrôle de l'infection \(HPCi\)](#)
[REFMED](#)
[Catalogue des examens](#)
[Tableau des antiseptiques au CHUV](#)
[Tableau des désinfectants au CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients \(BIP\)](#)

Directive institutionnelle : [Gestion de la douleur](#)

Directive institutionnelle : [Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments](#)

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation (PED/SCEA)

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Protection pour le lit
- 1 Médicament(s) prescrit(s)
- 1 Seringue d'eau minérale
- 1 Compresse(s) stérile(s)

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Vérifier l'emplacement de la sonde selon le schéma (cf : [Recommandation de pratique](#))
- Connecter la seringue d'eau minérale, purger la sonde avec 5ml, puis retirer la seringue de rinçage
- Connecter la seringue contenant la médication et injecter le contenu, puis retirer la seringue.
- Pas besoin d'un rinçage intermédiaire entre les traitements. Il est possible de rincer avec l'eau minérale après un médicament qui risque d'obstruer la sonde.
- A la fin de l'administration des médicaments, connecter la seringue d'eau minérale et rincer avec 5ml.
- Retirer la seringue
- Fermer la sonde à l'aide du système d'occlusion

Liens

Procédures de soins liées

[Sonde oro/nasogastrique : Alimentation - Hydratation \(PED/SCEA\)](#)

| Date de validation | Auteurs | Experts |
|--------------------|--|--|
| 21.10.2024 | Céline Lomme, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV | Sabine Vasseur Maurer, Médecin associée, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV Ermindo Di Paolo, Pharmacien clinicien, CHUV Lausanne |