

Procédure de soin

Cathéter sous-cutané (0-18 ans) / Retrait du cathéter

Pédiatrie

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Cathéter sous-cutané (0-18 ans)

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 2 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Sparadrap non tissé (Type : Micropore®)
- 1 Boîte de gants non stériles

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre les gants non stériles
- Décoller et retirer doucement le pansement tout en maintenant les ailettes du cathéter

- Retirer le cathéter par un mouvement rapide et fluide
- Appliquer une compresse stérile sèche sur le point de ponction
- Appliquer le pansement
- Retirer les gants

Liens

Procédures de soins liées

Cathéter sous-cutané (0-18 ans)

Date de validation	Auteurs	Experts
14.10.2019	Sandra Zoni, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Amélie Lassaigue, Infirmière, Soins intermédiaires de pédiatrie, DFME, CHUV Anne-Lyse Dulieu, Infirmière, Soins intermédiaires de pédiatrie, DFME, CHUV Laure Strauss, ICLS