

Procédure de soin

# Colostomie et Iléostomie : soins et surveillances (0-18ans) / Vidange de la poche

Pédiatrie

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

**L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.**

## Contexte

### Colostomie et Iléostomie: soins et surveillances (0-18ans)

## Technique de soin

### Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

1 Boîte de gants non stériles

1 Protection pour le lit

1 Boîte de lingettes sèches à usage unique (Type : "Susi") OU papier absorbant (Type papier toilette)

- 1 seringue graduée chez le nourrisson 0-12 mois

- 1 pot gradué chez l'enfant dès 1 an

## Déroulement du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Ouvrir la poche et la vider :
  - à l'aide d'une seringue chez le nourrisson 0-12 mois
  - dans un pot gradué chez l'enfant dès 1 an
- Nettoyer l'ouverture extérieur de la poche avec du papier absorbant ou la lingette à usage unique  
En cas de souillure visible sur la poche, la nettoyer à l'eau et au savon
- Refermer la poche
- Quantifier le volume de selles
- Retirer les gants
- Mettre un gant sur la main qui va saisir le pot de vidange
- Saisir le pot et l'amener directement dans le laveur/désinfecteur en utilisant sa main non gantée pour ouvrir les portes et programmer le laveur désinfecteur
- Retirer le gant

## Liens

### Procédures de soins liées

**Colostomie et Iléostomie : soins et surveillances (0-18ans)**

Date de validation	Auteurs	Experts
19.05.2021	Sandra Zoni, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Nathalie Mangin, ICUS Stomatérapie Claire Genoud, infirmière stomatérapeute Chloé Tenthorey, ICLS Néonatalogie Mélanie Pereira Fevereiro, Infirmière PF, Unité de l'enfant hospitalisé, CHUV Sabine Vasseur Maurer, Médecin associée, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV