

Procédure de soin

# Colostomie et lléostomie : soins et surveillances (0-18ans) / Soins de stomie distale

Pédiatrie

# Généralités

#### **Avertissement**

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

#### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tableau des antiseptiques au CHUV

Directive institutionnelle : <u>Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV</u> Directive institutionnelle : <u>Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)</u>

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : <u>Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des</u>

médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

#### Contexte

Colostomie et Iléostomie: soins et surveillances (0-18ans)

# Technique de soin

#### Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Protection pour le lit
- 1 Flacon de NaCl 0.9% 20ml les 10er jours puis 1 bassine/cuvette avec de l'eau tiède du robinet
- 1 Boîte de lingettes sèches à usage unique (Type : "Susi") Ou 1 emballage de compresses non tissées et non stériles

#### · Pour les premiers jours





- o 1 ciseau stérile
- $\circ~$  1 morceau de Jelonet  $^{\scriptscriptstyle TM}$
- o 1 emballage de compresse stérile 5x5 cm
- o 1 rouleau de Mepore
- · Lorsque la stomie est calme
  - o Pansement Mepilex Border Lite® 4x5 cm

#### Déroulement du soin

#### **Prérequis**

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

# Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les <u>5 moments de l'hygiène des mains</u>

- Mettre une paire de gants non stériles
- Nettoyer la stomie avec
  - NaCl 0,9% chez nourrisson pendant les 10er jours
  - Eau tiède
- Sécher en tamponnant.
- Retirer les gants
- Appliquer
  - 1ers jours: petit morceau de Jelonet™ recouvert d'une compresse et maintenu par un Mepore (à couper avec le ciseau stérile)
  - $\circ~$  Lorsque la stomie est calme : un Mépilex Border Lite  $^\circledR$

# Liens

#### Procédures de soins liées

# Colostomie et Iléostomie : soins et surveillances (0-18ans)

Date de validation	Auteurs	Experts
19.05.2021	Sandra Zoni, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Nathalie Mangin, ICUS Stomathérapie Claire Genoud, infirmière stomathérapeute Chloé Tenthorey, ICLS Néonatologie Mélanie Pereira Fevereiro, Infirmière PF, Unité de l'enfant hospitalisé, CHUV Sabine Vasseur Maurer, Médecin associée, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV

