



Cathéters veineux et nutrition parentérale

Avertissements :

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié. La forme et le contenu de ce document doivent faire l'objet d'amélioration continue dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

ATTENTION ! Ces recommandations sont génériques et peuvent être discutées avec la nutrition clinique et la pharmacie au cas par cas.

	<u>Cathéter veineux périphérique (CVP)</u>	<u>Cathéter veineux périphérique long (Midline)</u>	<u>Cathéter veineux central inséré en périphérie (PICC)</u>	<u>Cathéter veineux central (CVC)</u>	<u>Chambre à cathéter implantable (CCI)</u>
Définition	Cathéter veineux court inséré dans une veine superficielle. 	Cathéter veineux inséré dans une veine périphérique dont l'extrémité ne dépasse pas la veine axillaire 	Cathéter veineux central inséré par une veine périphérique. 	Cathéter veineux central inséré dans le système veineux profond. 	Chambre d'accès veineux central implanté chirurgicalement sous la peau. L'accès se fait à l'aide d'une aiguille 
NP adaptée	NP ternaire par voie veineuse périphérique : • PeriOlimel® avec électrolytes 2.5%	NP ternaire par voie veineuse périphérique : • PeriOlimel® avec électrolytes 2.5%	NP ternaire par voie veineuse centrale : • Omegaflex® Special • Omegaflex Plus® NP binaire (sans lipides) par voie veineuse centrale : • Nutriflex Plus® 48/150	NP ternaire par voie veineuse centrale : • Omegaflex® Special • Omegaflex Plus® NP binaire (sans lipides) par voie veineuse centrale : • Nutriflex Plus® 48/150	NP ternaire par voie veineuse centrale : • Omegaflex® Special • Omegaflex Plus® NP binaire (sans lipides) par voie veineuse centrale : • Nutriflex Plus® 48/150
Durée de traitement	Max 72h		>7 jours et jusqu'à plusieurs mois	Max 4 semaines	Jusqu'à plusieurs mois

Lumière minimale du cathéter	Min 18G		Min 22G
Ajout de médicaments	*Cf « Nutritions parentérales ternaies chez l’adulte et incompatibilités physico-chimiques »		
Médicaments en Y	Sur même voie avec ou sans robinet : non	- Sur même lumière avec ou sans robinet : non - Sur autre lumière: oui	Sur même voie avec ou sans robinet : non
Rinçage pulsé	- Entre chaque poche de NP avec 10ml de NaCl 0.9% - A la fin de la poche de NP, si verrouillage, avec 20ml de NaCl 0.9%		
Fréquence changement de la ligne de perfusion	24 heures : tubulure		
Prélèvement de sang	Sur même voie : non	- Sur même lumière : non - Sur autre lumière : se référer à la procédure de la fiche technique relative au dispositif	Sur même lumière : non

Etapes	Auteurs	Date
Révision	Groupe Méthodes de soins - CHUV	03.2026
Rédaction	Groupe Méthodes de soins - CHUV Nutrition clinique : Dre G. Fotsing-Makougang – cheffe de clinique, Florence Gatsigazi-Emery – infirmière spécialiste Pharmacie clinique : A.-C. Binois – pharmacienne répondante REFMED, Dre N. Perrottet-Ries – responsable unité pharmacie clinique, Dr P. Voirol – pharmacien chef adjoint	05.2023